



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حران

مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)
بندرعباس

آبسه های دهان، فک و صورت



شناسنامه موقت آموزشی کد: P.E:1401:07//30-00100

عنوان	آبسه های دهان، فک و صورت
تهیه کننده	سولماز فاتح
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بازنگری	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت	
تائید کننده علمی: آقای دکتر حسام الدین اعتمادی- متخصص جراحی دهان، فک و صورت	



-درمان بهتر به وسیله ویزیت های متعدد، مراجعه به پزشک و ارزیابی دوباره انجام شود. همکاری با پزشکان توسط پی گیری، آموزش های لازم جهت اطمینان از مراقبت شما و خانواده تان ضروری می باشد.



“سلامت و تندرست باشید”

منبع:

ترجمه، علی اصغرپور و همکاران (۱۴۰۰)، پرستاری چشم، گوش، حلق و بینی برونر و سودارث، ویراست پانزدهم، انتشارات جامعه-نگر

استفاده از دهان شویه و کشیدن دندان، مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی.



استفاده از آنتی بیوتیک هایی که دکتر تجویز نموده است.



مراقبت های پس از عمل

-در صورت درد دندان استفاده از داروهای ضد التهابی مثل ایبوپروفن و ناپروکسن جهت کاهش درد و التهاب استفاده کنید.



-در آبسه های دندانی هر بیمار باید کلیه آموزش های پزشک را جهت مراقبت های بعدی انجام دهد.



آبسه های دهان، فک و صورت

آبسه های ناحیه دهان، فک و صورت معمولاً به علت پوسیدگی و آلودگی میکروبی مغز دندان و یا بیماری های لته ایجاد می شود.



با انتشار آلودگی از طریق ریشه دندان و شیار لته ای به داخل استخوان و سپس سوراخ شدن استخوان و توسعه به بافت های مجاور علائم بروز می کند.



عفونت های دهان و دندان در موارد شدید می تواند به نواحی دورتر چون داخل جمجمه، چشم ها، گردن و قفسه سینه انتشار یافته و خطرات بالقوه ای همچون مرگ و میر را همراه داشته باشد. به همین دلیل درمان هرچه سریعتر به پزشکان، متخصصین جراحی فک و صورت ضروری است.



علائم آبسه های دندانی



۱

علامت اولیه در آبسه های دندانی، درد در ناحیه فک، بخصوص هنگام فشار روی دندان ها و معاینه آنها می باشد.

در ادامه تب، بی حالی، شل شدن دندان، تورم، حساس و قرمز شدن روی لته ها و سپس پوست، ترشح چرک داخل دهان و یا سوراخ های ایجاد شده روی پوست می باشد.



در صورت عدم درمان مناسب و درگیری های فضاهای صورت و گردن بیمار دچار ناتوانی در باز کردن دهان دشواری در بلعیدن غذا و مایعات و در نهایت مشکلاتی در تنفس خواهد شد که نشاندهنده وخامت حال بیمار است.



پیشگیری

مراقبت و رعایت بهداشت دهان و دندان مراجعه منظم به دندانپزشک.



۲

پرهیز از استعمال دخانیات.



رژیم غذایی مناسب از جمله موارد پیشگیری از این عفونت هاست.

در صورت بروز علائم اولیه آبسه ها و عفونت دندانی - فک، مراجعه سریع به دندانپزشک و متخصصین جراحی فک و صورت ضروری است.



درمان آبسه

درمان آبسه های دندانی - فکی شامل: درمان های طبی و دارویی و نیز درمان های جراحی است.

اولین اقدام در درمان حذف عامل ایجاد کننده آبسه، درمان ریشه دندان و یا کشیدن دندان عفونی و دندان های نیمه نهفته و درمان عفونت های لته ای می باشد.



ترمیم سایر دندان های پوسیده الزامی می باشد.



۳