.عــوارض روانــی

تــوهــم

هذیــان

درمـــان

بستری شدن در بیمارستان اغلب برای اطمینان از ایمنی بیمار لازم است.

داروهای ضد روان پریشی برای مدیریت و درمان رفتارهای آسیب رسان مانند، (هذیان ،توهم و پرخاشگری) استفاده می گردد. این گونه داروها تأثیر آرام‌کننده یا آرام بخش زیادی دارند.

کلروپرومازین، فلوفنازین، پرفنازین، هالوپریدول، الانزاپین، تری فلوئوپرازین ، ریسپریدون از جمله داروهای ضد روان‌پریشی هستند .

گروه درمانی یا مشاوره روانی نیز کمک کننده است.

سلامت و تندرست باشید.

منبع:

متقی پور، یاسمن، بیرقی، نرگس، کرملو، سمیرا،.(۱۳۹۸). بیماری های شدید روانپزشکی، انتشارات گیسا، چاپ سوم.

مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)
بندرعباس

سایکوز مصرف شیشه

شناسنامه پمفلت آموزشی کد:P.E:1401/07/30-0014	
عنوان	سایکوز مصرف شیشه
تهیه کننده	گروه آموزش
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
بازنگری	۱٤۰٤/۰۱/۱٥
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت	
تائید کننده علمی: آقای دکتر علی مسعودی فر- متخصص اعصاب و روان	

سایکوز ناشی از مصرف شیشه

سایکوز نوع شدید بیماری روانی است که ویژگی عمده آن فقدان واقعیت سنجی یا قطع ارتباط با دنیای واقعی است.

معمولاً بیمار رفتارها و صحبت های غیر طبیعی دارد. فعالیت‌های جسمی و روانی او به حدی دچار اختلال می شود که باعث به هم ریختگی فعالیت های فردی و اجتماعی اش می‌شود. اصلی ترین ویژگی آنها نوعی قطع ارتباط با واقعیت است.

علائم

توهم: شنیدن ودیدن اجسامی که وجود خارجی ندارند و دیگران قادر به شنیدن ودیدن آن اجسام نیستند.

اصلاح نمی شود و با باورهای دینی، اجتماعی و فرهنگی فرد نیزمتناسب نمی شود.

روانپریشی ناشی از سوء مصرف شیشه

شیشه یک ماده محرک و اعتیاد آور است و مغز و سیستم عصبی را به شدت تحریک می‌کند، باعث افزایش حالت تهاجمی و افزایش حرکات جسمی می‌شود.

این ماده به شکل پودری سفیدرنگ (شبیه بلورهای شیشه) و بدون بو است.

راه های مصرف شیشه:

-تدخینی

-تزریقی

استنشاقی

روانپریشی ناشی از سوء مصرف شیشه اختلالی است که بدنبال اثرات سمی شیشه بوجود می آید. بصورت اختلال در قضاوت یا توهم ها و هذیان ها تظاهر می کند.

طبیعی است که فرد قدرت تشخیص و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را ازدست می دهد.

عوارض جسمی

بی اشتها یی، کاهش وزن، افزایش فشارخون و ضربان قلب ، افزایش تعداد تنفس، افزایش فعالیت فیزیکی، افزایش دمای بدن و تحریک پذیری و بی خوابی گیجی، لرزش و تشنج، اضطراب و بدبینی و خشونت و افزایش زیاد دمای بدن. سکته مغزی و سکته قلبی.