




مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)
بندرعباس

برونکوسکوپی



شناسنامه پمفلت آموزشی کد: P.E:1401/07/30-0084

عنوان	برونکوسکوپی
تهیه کننده	رقیه کوهستانی
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سال بازنگری	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت	
تائید کننده علمی: آقای دکتر احسان رضائیان نیک- فوق تخصص بیماری های ریه	



۵

در صورت بروز یکی از نشانه های زیر بعد از انجام

برونکوسکوپی به پزشک مراجعه کنید:

خونریزی به صورت خلط خونی شدید با علامت بی قراری ، کاهش

فشار خون ، افزایش ضربان قلب ، کبودشدگی، تنگی نفس ، سیاه

شدن شدن نوک انگشتان و لب ها

درمان جایگزین :

سی تی اسکن، نمونه برداری تحت راهنمایی سونوگرافی

“سلامت و تندرست باشید“

منبع:

مترجم ، نصیریانی، خدیجه و همکاران(۱۳۹۸)، هندیوک آموزش به بیمار، ماری، ام
کاناییو، چاپ چهارم، انتشارات جامعه نگر

اقدامات بعد از برونکوسکوپی

*لوله دهانی از دهان بیمار خارج می شود .

*سر تخت بیمار کمی بالا آورده می شود .

*برای بررسی عوارض برونکوسکوپی ممکن است عکس از ریه-ها

گرفته شود

*در صورت بروز سرفه یا دفع ترشحات خونی یا مشکل در نفس

کشیدن یا خس خس و درد قفسه سینه فوری به پزشک اطلاع دهید.

* برای کنترل سلامتی بعد از برونکوسکوپی یک حس گر (پالس

اکسی متر) به انگشت بیمار وصل می گردد تا ضربان قلب و اکسیژن

بدن نمایش داده شود و تحت بررسی باشد .



*چنانچه بعد از برونکوسکوپی احساس درد در گلو یا کمی تب

داشته باشید جای نگرانی نیست و بزودی برطرف می گردد .

*بعد از دو ساعت در صورت از بین رفتن بی حسی در گلو می

توانید غذای نرم و سپس معمولی استفاده نمایید .



۴

برونکوسکوپی

برونکوسکوپی عملی است که طی آن پزشک به کمک یک وسیله باریک داخل حنجره، تراشه، برونش و ریه ها را می بیند.

دلایل انجام برونکوسکوپی


*تشخیص مشکلات راه های تنفسی مثل: خونریزی، تنفس سخت یا التهاب بعلت بیماریهای ریوی و عفونت های ریوی مانند سل

*نمونه برداری

*تشخیص سرطان و میزان توسعه سلولهای سرطانی در ریه

*خارج کردن اجسامی که باعث گرفتگی راههای هوایی شده است

*کنترل خونریزی ریه



موارد زیر را قبل از انجام برونکوسکوپی رعایت کنید :

* قبل از انجام برونکوسکوپی بیمار یا کسی که کفالت او را به عهده دارد باید برگه رضایت عمل را به دقت خوانده و سپس امضاء کند .

*کنترل داروهایی که بیمار مصرف می کند بخصوص رقیق کننده های خون که در صورت مصرف داروهایی مثل وارفارین باید ۷۲ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپی قطع شود .



*در صورت داشتن هرگونه آلرژی یا حساسیت به پزشک و پرستار اطلاع دهید.

*در دست داشتن کلیه آزمایشات و مدارک مربوط به بیماری

*ناشتا بودن بیمار از ۸-۶ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپی

*خارج کردن دندانهای مصنوعی یا لنزهای چشمی.

* داشتن یک نفر همراه الزامی است.



مراحل انجام برونکوسکوپی

*برای وارد کردن لوله باریک برونکوسکوپ، یک بیحس کننده در دهانتان اسپری می گردد. و برای کنترل سلامتی در حین کار یک حس گر (پالس اکسی متر) به انگشتان بیمار وصل می گردد تا ضربان قلب و اکسیژن بدن نمایش داده شود .

*برای راحتی کار در حین برونکوسکوپی ممکن است یک داروی خواب آور و آرام بخش به بیمار تزریق شود .

*لوله دهانی مخصوص رد کردن برونکوسکوپ را داخل دهان او می گذاریم .

*برونکوسکوپ توسط پزشک از راه بینی یا دهان بیمار به داخل مجرای تنفسی هدایت می شود .

*قبل از انجام کار به بیمار تذکر دهید که اگر این کار از راه دهان

انجام شود بیمار باید از راه بینی تنفس نماید یا با دهان باز نفس بکشد .

