



مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)
بندرعباس

داروهای مصرفی در همودیالیز و

عوارض



شناسنامه پمفلت آموزشی کد: P.E:1401/07/30-0019

عنوان	داروهای مصرفی در همودیالیز و عوارض
تهیه کننده	گروه آموزش
تأیید کننده	کمیته آموزش به بیمار
بازنگری	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت	
تأیید کننده علمی: دکتر محمد تمدن دار فوق تخصص نفرولوژی	



نفروریت



مکمل غذایی شامل ویتامین های B1، B2، B12، B6، بیوتین و روی است. به دلیل محدودیت در رژیم غذایی و بی‌اشتهایی، مصرف این دارو توصیه می‌شود.

در نتیجه در سلامت و نگهداری بافت‌ها، تقویت و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی بدن مؤثر است.



سیناکست



داروی اختصاصی تر در درمان هورمون پاراتیروئیدی (PTH بالا) این دارو در صورت کلسیم خون بالاتر از ۸/۴ تجویز می‌شود، به علت این- که این دارو باعث کاهش کلسیم می‌شود بنابراین در سطح کلسیمی پایین تجویز نمی‌شود.

عوارض

- کاهش شدید فعالیت سلول‌های استخوانی.
- تهوع شایع می‌باشد.



“سلامت و تندرست باشید”

منبع:

عسکری، محمدرضا، سلیمانی، محسن (۱۳۹۸). مراقبت‌های پرستاری ویژه، انتشارات بشری، چاپ ۳۲.

اپرکس (اریتروپویتین)



جهت درمان و اصلاح کم‌خونی (با تأثیر بر مغز استخوان) به شکل مایع بی‌رنگ و به‌صورت آمپول‌های ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ واحد عرضه می‌شود.

نحوه‌ی مصرف در منزل

- تزریق به صورت زیر جلدی با استفاده از سرنگ انسولین. حداکثر حجم تزریقی باید ۱ سی‌سی باشد. محل تزریق در بازوها و دیواره قدامی شکم (دور ناف) که باید به‌طور مداوم تغییر کند.

- در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی آن جلوگیری شود (رنگ محلول باید شفاف باشد).

- قبل از تزریق فشارخون کنترل شود، در صورت فشارخون بالای ۱۶۰ میلی‌متر جیوه در منزل دارو تزریق نشود.

عوارض دارو

با مصرف بیش از اندازه اپرکس، غلظت خون افزایش می‌یابد که می‌تواند باعث از کار افتادن فیستول شود و همچنین باعث افزایش فشارخون می‌شود.



کلستترول (روکاترول)



این دارو فرم فعال ویتامین D3 می باشد. برای درمان کاهش کلسیم خون و افزایش هورمون پاراتیروئیدی (PTH) تجویز از طریق خوراکی یا تزریقی می گردد.

نحوه مصرف

طبق دستور برای تأثیر بهتر بعد از دیالیز مصرف می شود.

عوارض: خواب آلودگی، سردرد، ضعف، تاری دید، بی اشتها، تهوع، یبوست.

شرایط نگهداری: دور از نور و حرارت نگهداری شود.



سولامر



قرص ۸۰۰ میلی گرم موجود می باشد.

برای درمان فسفر بالا (فسفر را از طریق دستگاه گوارش دفع می کند).

عوارض

سردرد، تهوع، استفراغ، کاهش فشارخون.

نحوه مصرف

دارو را همراه با غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف کنید.

نکته

فاصله مصرف سولامر با داروهای ضد تشنج، وارفارین و سیپروفلوکساسین باید حداقل یک تا دو ساعت باشد.



کربنات کلسیم



قرص ۵۰۰ میلی گرم موجود می باشد. کربنات کلسیم در روده با فسفر موجود در غذا ترکیب شده و از جذب آن در ورود به جریان خون جلوگیری می کند.

عوارض


در صورت بروز علائمی نظیر بی اشتها، تکرر ادرار، خشکی دهان، گیجی و هذیان که نشان دهنده ی افزایش بیش از حد کلسیم در بدن می باشد، باید سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.

نحوه مصرف

اگر هدف از درمان اصلاح کلسیم است، باید دارو را یک ساعت بعد از غذا و با یک لیوان پر از آب میل کنید. اگر هدف اصلاح فسفر است، دارو باید وسط غذا میل شود.

نکته:

آنتی بیوتیک ها و آهن، جذب خوراکی کلسیم را مختل می کنند، به همین دلیل با فاصله زمانی از هم مصرف می شوند.



اسید فولیک



در بیماران کم خون، جهت تأیید گلوبول قرمز و خون-

سازی مصرف می شود.

عوارض: راش، قرمزی، خارش، ضعف عضلانی.



آهن تزریقی



از ترکیبات آهن و ضد کم خونی می باشد. به شکل آمپول های ۵ میلی لیتری که حاوی ۱۰۰ میلی گرم آهن است عرضه می شود.

عوارض

افت فشار خون، تغییر موقت حس چشایی، تهوع و احساس طعم فلز در دهان می باشد.

نکته

ونوفر نیازی به نگهداری در یخچال ندارد و با هیچ دارویی نباید مخلوط شود. در زمان مصرف قرص آهن قطع شود.



آلومینیوم هیدروکساید

بیشتر به صورت شربت در درمان اولیه فسفر بالا تجویز می شود.

عوارض جانبی

به علت عوارض خونی، عصبی، استخوانی، از مصرف طولانی مدت این دارو باید اجتناب شود.

یبوست نیز از عوارض مهم به شمار می رود.

