



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان

مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)
بندرعباس

داروهای مصرفی در هموفیلی



شناسنامه پمفلت آموزشی کد: P.E:1401/07/30-0032	
عنوان	داروهای مصرفی در هموفیلی
تهیه کننده	نجمه باقری
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال بازنگری	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت	
تأیید کننده علمی: خانم دکتر ملیحه محمدزاده ایسینی - فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان	

-انفوزیون فاکتور IX جهت جایگزینی کمبود موجود در هموفیلی B به صورت موقت منجر به حفظ هموستاز می گردد.



مراقبت های پرستاری:

- این فرآورده تنها جهت انفوزیون وریدی کاربرد دارد و لازم است به آهستگی انفوزیون شود.
- کاهش سرعت انفوزیون یا تجویز آنتی هستامین ها به رفع بعضی از عوارض جانبی کمک می کند.



- فرآورده های تهیه شده از پلاسما ی انسانی می توانند منجر به انتقال عفونت شوند.
- لازم است حین درمان با این دارو، سطح فاکتور IX و PT و PTT و علائم ناشی از واکنش های بیش حساسیتی ، DIC و ترومبوز پیگیری گردد.

”سلامت و تندرست باشید“

منبع:

ترجمه زاهدی زهره و همکاران. ۱۳۹۸، راهنمای پرستاری اختلالات هموگلوبین، چاپ اول، ۱۳۹۸



جراحی دندان، جراحی مازور و خونریزی شدید استفاده می شود.

عوارض جانبی:

- سندرم نفروتیک در بیماران مبتلا به هموفیلی B با سابقه واکنش های آلرژیک.
- احتمال ایجاد آنتی بادی های خنثی کننده بر علیه فاکتور IX ادر بیماران هموفیلی B.
- احتمال وقوع اپیزودهای ترومبوآمبولیک (لخته خون).
- واکنش های آلرژیک یا واکنش های ازدیاد حساسیت غیر اختصاصی نادر.

موارد منع مصرف:

- در بیماران دچار نارسایی کبدی با احتیاط مصرف شود به علت وجود خطر DIC (انعقاد داخل عروقی).
- حساسیت شدید

مکانیسم اثر:

این دارو جایگزین فاکتورهای انعقادی در بیماری هایی که شامل: کمبود فاکتور ۹ یا هموفیلی B هستند استفاده می شود که در این بیماران یا به صورت مادرزادی یا سنتز فاکتور IX انا کافی می باشد.



فاکتور ۸ یا VIII:

این دارو جهت کنترل و پیشگیری از خونریزی در بیماران هموفیلی A استفاده می شود.


شکل دارویی: به صورت تزریقی و پودر ۵۰۰ g - ۲۵۰g میزان دوز مصرفی آن به غلظت مطلوب فاکتور ۸، وزن بدن و شدت خونریزی بستگی دارد.



دوز مصرفی دارو:

دوز مصرفی در فواصل ۸ تا ۲۴ ساعت تجویز می شود.

موارد استفاده:



- خونریزی های خفیف از مفاصل و ماهیچه ها.
- خونریزی های دهانی و خونریزی گلو.
- خونریزی های تهدید کننده حیات مانند CNS.

عوارض جانبی:

- واکنش های حساسیتی.
- تنگی نفس
- ضربان قلب سریع
- تورم محل تزریق



مکانیسم اثر:

- تجویز این دارو باعث افزایش سطح فاکتور ۸ در پلاسما خون می شود.
- از خونریزی خود بخودی یا بعد از تروما در این بیماران جلوگیری می کند.

موارد منع مصرف:

- در بیمارانی که قبلاً حساسیت داشته اند مصرف نشود.
- در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود.
- در کمبود سایر فاکتورهای انعقادی استفاده نشود.
- در کودکان و نوزادان با احتیاط مصرف شود.

مراقبت های پرستاری:

- قبل از رقیق شدن فرآورده در دمای ۸-۲ سانتی گراد در یخچال نگهداری شود و منجمد نشود.
- به بیمار توصیه می شود هر گونه واکنش حساسیتی را گزارش دهد.
- به علائم واکنش بیمار مثل تب و کهیر و درد پشت توجه شود.
- برنامه تزریق فاکتور باید به صورت پیشگیری از خونریزی باشد.



- جهت جلوگیری از خونریزی باید اقدامات محافظتی مثل واکسیناسیون و مراقبت از دندان ها انجام شود.
- مشاوره روانشناسی در مواقع بروز مشکلات خانوادگی و استرس های غیر عادی و یا بدنبال خونریزی های ناتوان کننده.
- اجتناب از تزریق عضلانی و یا هر ترومای دیگر.
- عدم تجویز داروهایی مثل آسپرین و داروهای ضد التهاب و سایر داروهای ضد انعقاد.



فاکتور ۹:

- دارویی که جهت پیشگیری و درمان خونریزی در هموفیلی نوع B استفاده می شود.



اشکال دارویی:

- به صورت تزریقی ویال ۵۰۰ واحدی.
- به صورت پودر ۵۰۰-۲۵۰-۱۰۰۰ واحدی.

موارد مصرف:

- این دارو از راه تزریق آهسته وریدی مصرف می شود.
- مقدار مصرف بر اساس نیاز هر فرد تنظیم می شود.
- میزان دوز مصرفی آن به غلظت مطلوب فاکتور IX، وزن بدن و شدت خونریزی بستگی دارد.

