



مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)
بندرعباس

ریتوکسی ماب

Rituxan
Rituximab



ریتوکسیماب

شناسنامه پمفلت آموزشی گد: 00135 - 1401/07/30 P.E:

عنوان	ریتوکسی ماب
تهیه کننده	آمنه فلاح
نایب کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سال بازنگری	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
ناظر کیفی: سوپروایزر آموزش سلامت	
نایب کننده علمی: آقای دکتر احمد نگهی - متخصص مغز و اعصاب	



هشدارهای بعد از تزریق

در صورت برطرف نشدن علائم فوق و تشدید علایم سریعا به پزشک خود مراجعه نمایید.

خانم ها در سنین باروری باید در طول درمان حتما تا ۳ ماه از روش های جلوگیری از بارداری استفاده کنند و در صورت شک به بارداری به پزشک خود اطلاع دهند. در طول درمان با این دارو باید آزمایش های خون و کبدی به صورت دوره ای انجام شود.

”سلامت و تندرست باشید“

ریتوکسی ماب یک داروی تعدیل کننده بیماری ام اس می باشد. ریتوکسی ماب دارویی است که با تاثیر بر سیستم ایمنی اغلب سبب کنترل بیماری می شود. در نتیجه با کاهش تعداد و شدت حملات باعث بهبود کیفیت زندگی شده و از پیشرفت بیماری تا حدودی جلوگیری می کند.

نکات مهم قبل از تزریق

قبل از تزریق در صورت داشتن هر کدام از علایم زیر حتما به پزشک خود اطلاع دهید:

- علایم عفونت مانند: تب، لرز، گلودرد، سرفه، سوزش ادرار

- احتمال بارداری

- سابقه بیماریهای قلبی، کبدی، فشارخون، هپاتیت

- مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و واکسیناسیون اخیر

- سابقه بروز واکنش ناخواسته حین تزریق های قبلی از جمله مشکلات قلبی، تنفسی، پوستی

- مصرف داروهای پایین آورنده فشارخون و قند خون

عوارض حین تزریق دارو

- ممکن است واکنش های حساسیتی مانند کهیر، تنگی نفس، افت فشارخون و مشکلات قلبی عروقی ایجاد شود.

علائم شایع حین تزریق عبارتند از گلودرد، سردرد، تب و لرز، تهوع استفراغ و دردهای خفیف عضلانی که معمولا در عرض چند روز برطرف می شود. در صورت تشدید این علایم به پزشک خود مراجعه نمایید.



منبع:

<https://mscenter.ir/>