

آموزشهای بعد از عمل جراحی آب مروارید (کاتاراکت)

داروهای مورد استفاده بعد از عمل:

– قطره کلویوتیک (در نارنجی)

✚ هر ۶ ساعت یک قطره تا یک هفته و سپس قطع گردد.

– قطره بتامتازون (در سفید)

✚ روز اول بعد از عمل هر ۲ ساعت

✚ روز دوم تا یک هفته بعد از عمل هر ۴ ساعت

✚ هفته دوم بعد از عمل هر ۶ ساعت

✚ هفته سوم بعد از عمل هر ۸ ساعت

✚ هفته چهارم بعد از عمل هر ۱۲ ساعت و سپس قطع گردد.

توجه: ★

✚ قطره‌های چشمی در طول روز بطور مرتب چکانده شوند و از ساعت ۱۲ شب به بعد نیازی به چکاندن قطره نیست.

✚ هنگام خواب شبانه نیاز به بیدار شدن و چکاندن قطره نیست.

✚ تا یک هفته بعد از جراحی شستشوی صورت و حمام انجام نشود.

✚ در صورت کاهش دید، درد شدید و ترشح چرکی از چشم اگر به پزشک خود دسترسی ندارید در هر ساعت از شبانه روز

و روزهای تعطیل به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.

✚ شیلد یا محافظ پلاستیکی تا یک هفته شبانه‌روزی روی چشم باشد.

✚ از مالیدن و فشار دادن چشم خودداری شود.

