

آنژین صدری یک سندرم بالینی است که با حملات درد یا فشار بر قسمت قدامی قفسه سینه مشخص می شود علت آن جریان خون ناکافی عروق کرونر (عروقی که به ماهیچه قلب خونرسانی می کند) می باشد .

آنژین صدری در نتیجه تجمع پلاک و چربی در دیواره عروق کرونر و تنگی دیواره عروق ایجاد می شود . این تجمع پلاک و چربی در دیواره عروق را آترواسکلروز می نامند .


انواع آنژین صدری

1- آنژین پایدار : درد قابل پیش بینی دقیق که با فعالیت آغاز و با استراحت بر طرف می گردد.

2- آنژین ناپایدار : در این حالت علائم هنگام استراحت هم ظاهر شده و شدیدتر و طولانی تر از حملات قبلی هستند .

علائم بالینی

1- درد قفسه سینه که از یک احساس فشار در قفسه سینه تا درد شدید متفاوت است که



معمولا به گردن ، فک ، شانه ها و سطح داخلی بازوها منتشر می شود .

2- تنگی نفس

3- رنگ پریدگی ، تعریق ، سیاهی رفتن چشم

4- تهوع و استفراغ

توجه :

در بیماران مبتلا به دیابت ممکن است درد آنژین نداشته باشند و ممکن است علائم فقط به صورت سوء هاضمه خود را نشان دهد .



تدابیر طبی :

اهداف مراقبت و درمان طبی شامل کاهش نیاز ماهیچه قلب به اکسیژن و افزایش اکسیژن رسانی به قلب می باشد . برای رسیدن به این اهداف می توان از درمان دارویی روش های عروق سازی مجدد مانند آنژیوپلاستی و عمل جراحی قلب باز (CABG) استفاده کرد .

با تغییر روش زندگی و رعایت نکات زیر می توان احتمال بروز درد آنژین را کم کنید .

1- داروهایتان را سر وقت و طبق تجویز پزشک استفاده کنید و از قطع ناگهانی داروها بدون نظر پزشک جدا خودداری کنید .

2- رژیم غذایی کم نمک و کم چربی حاوی فیبر زیاد و در صورت لزوم کم کالری باشد . ترجیحا گوشت سفید (مرغ و ماهی) را جایگزین گوشت قرمز کنید .

3- حداقل 3 روز در هفته 30 دقیقه پیاده روی کنید .

4- فعالیت ها را با تنظیم دوره های استراحت به خود متفاوت انجام دهید به طوری که باعث ناراحتی قفسه سینه ، تنگی نفس و خستگی نشود .

5- از ورزش ، پیاده روی در هوای خیلی سرد و خیلی گرم خودداری کنید .

6- مصرف سیگار و تنباکو را قطع کرده و از حضور در مکان هایی که سیگار می کشند خودداری کنید .

7- از مصرف الکل اجتناب کنید .

باسمه تعالی



بیمارستان شهید محمدی

آنژین صدری

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

(افسر امیرسادات) کارشناس ارشد سالمندی

تایید کننده علمی: دکتر شاهین عباس زاده

فوق تخصص قلب و عروق

1395

آدرس الکترونیکی بیمارستان

ها له کنید و آن را زیر زبان نگه دارید تا سریعتر جذب شود.

2- بعد از مصرف نیتروگلسیرین حتما بنشینید تا از کاهش فشار خون ناگهانی غش جلوگیری کند.

3- عوارض نیتروگلسیرین: برافروختگی، کاهش فشار خون و سردرد می باشد. جهت بهتر شدن سردرد می توانید از استامینوفن استفاده کنید.

4- در تمام اوقات داروها را به همراه داشته باشید. دارو را دور از نور و رطوبت و گرما نگهداری کنید.

5- قبل از هر فعالیتی از داروی نیتروگلسیرین زیر زبانی که موجب درد آنژینی می شود استفاده کنید مانند بالا رفتن از پله فعالیت جنسی زیرا نیتروگلسیرین تحمل فرد را نسبت به ورزش و استرس زیاد بالا می برد.



منبع: Medical surgical Nursing Brunner
2014

8- سطح فشار خون را با انجام توصیه های پزشک به حد طبیعی برسانید.

9- از مصرف داروهای فاقد نیاز به نسخه دارویی (مثل قرص های رژیم لاغری قطره های ضد احتقان بینی و ...) برای نخستین بار بدون مشورت پزشک خودداری کنید.

10- جهت کاهش استرس از روش های مدیتیشن تن آرامی استفاده کنید.

اگر درد آنژینی پس از استفاده از 3 قرص زیر زبانی نیتروگلسیرین به فاصله 5 دقیقه ای آرام نشد، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

در مورد نیتروگلسیرین زیر زبانی نکات زیر را به خاطر داشته باشید.

1- قبل از استفاده از قرص زیر زبانی نیتروگلسیرین مطمئن شوید دهان و زبان شما مرطوب است. قرص را زیر زبان خود قرار داده و بزاق خود را فرو نبرید، تا وقتی که قرص کاملاً حل شود (اگر درد شدید است می توانید قرص را بین دندان