

پارگی کبد

در صدمه به ناحیه شکمی ممکن است کبد آسیب ببیند شدت آسیب ممکن است خفیف تا پارگی بسیار شدید کبد باشد.

علائم صدمات کبدی:



1. درد در ناحیه ربع فوقانی راست
2. انتشار درد به شانه راست
3. حساسیت در ناحیه ربع فوقانی راست
4. پیشرفت سریع شوک (افت فشارخون- انقباض عروق جلدی- تعریق- کم ادراری- غلیظ شدن ادرار- کم خونی)

تشخیص :

- 1- معاینه بالینی
- 2- سونوگرافی
- 3- سی تی اسکن

درمان پارگی کبد:

اقدامات غیراز جراحی نیازمند بررسی دقیق بیمار از نظر خونریزی میباشد. در موارد صدمه شدید به علت تغییرات واضح و ناپایداری بیمار بلافاصله تحت عمل جراحی قرار میگیرد.

مراقبت قبل و بعداز عمل :

قبل از عمل بدلیل امکان تهوع و استفراغ بعداز عمل بصورت روتین 8 تا 12 ساعت از طریق دهان چیزی نباید خورده شود و پس از عمل نیز تا زمانی که پزشک صلاح بداند باید ناشتا باشید.

تا زمانی که پزشک اجازه نداده است نباید از راه دهان چیزی خورده شود.

طبق دستور پزشک رژیم غذایی با مایعات صاف شده در زمان مقرر بعداز عمل شروع و بتدریج پس از بازگشت حرکات روده و دفع گاز رژیم نرم و سپس معمولی در حد تحمل شروع می گردد . به بیمار توصیه می گردد قبل از رفتن به اتاق عمل از همراه داشتن وسایلی نظیر زیورآلات، دندان مصنوعی یا هر عضو مصنوعی دیگر لباس زیر خودداری کرده و آرایش و لاک ناخن نداشته باشد .

بعداز عمل ممکن است: پزشک جراحی در حین عمل جراحی لوله های پلاستیکی در درون زخم بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعداز جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند . همچنین جراح ممکن است جهت خروج ترشحات از معده و کم کردن فشار ناحیه عمل سوند بینی معده ایی بگذارد . باید مراقب بود که این اتصالات کشیده نشود و یا زیر بیمار قرار نگیرد.

فعالیت : جهت بهبود گردش خون و جلوگیری از ایجاد نفخ و مشکلات گوارشی باید هر چه سریعتر پس از عمل و اجازه پزشک معالج با کمک از بستر خارج شوید . پس از عمل باید در هنگام خروج از تخت ابتدا کنار تخت نشسته و پاها را آویزان کنید اگر دچار سرگیجه و تهوع نشدید در مدت چند دقیقه کنار تخت ایستاده و سپس با کمک راه بروید

در صورت وجود سوند ادراری:

- 1- کیسه ادرار را بالاتر از سطح بدن قرار ندهید زیرا ادرار آلوده وارد مثانه می شود و باعث عفونت مثانه می شود.
 - 2- کیسه تخلیه ادرار نباید با زمین تماس داشته باشد بهتر است بصورت قلابهایی از لبه تخت آویزان باشد.
 - 3- از دست کاری بی دلیل لوله و کیسه تخلیه خودداری کنید و مایعات فراوان بنوشید
- پس از خارج کردن سوند ادراری:

تخلیه ناقص مثانه در اثر وضعیت خوابیده در تخت می تواند سبب عفونت ادراری گردد لذا توصیه می شود مقدار کافی مایعات مصرف کرده و هر سه ساعت یکبار ادرار کنید و در صورت بروز تب یا سوزش و درد در هنگام ادرار کردن اطلاع داده شود.

جهت پیشگیری از مشکلات تنفسی و بهتر خارج شدن خلط می بایست تنفس عمیق و سرفه را همراه با قرار دادن دست روی محل برش جراحی (برای بی حرکت کردن ناحیه) به صورت موثر انجام دهید.

درد پس از جراحی: در چند اول بعد از عمل در محل جراحی احساس درد دارید در صورت درد پرستار طبق دستور پزشک سعی می کند با دادن مسکن درد شمارا کاهش دهد.

مراقبتهای لازم هنگام ترخیص:

- 1- محل زخم جراحی پس از عمل جراحی باید تمیز و خشک نگه داشته شود و در صورت وجود هرگونه قرمزی تورم حساسیت و یا ترشح چرکی از محل زخم و یا بروز تب سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
- 2- پانسمان به روش استریل روزانه تعویض گردد بخیه ها 14 روز بعد از عمل جراحی با نظر پزشک کشیده میشود و حمام رفتن سه روز بعد از عمل بلامانع است.
- 3- جهت تسکین درد در چند روز اول بعد از عمل از ضددردهای خوراکی تجویز شده استفاده کنید و در صورت درد غیرقابل کنترل به پزشک معالج مراجعه کنید.
- 4- داروهای تجویز شده از طرف پزشک معالج (انتی بیوتیکها و ضد درد ها) باید در فاصله زمانی معین مصرف گردد و از قطع یا تغییر مقدار خودسرانه دارو بپرهیزید.
- 5- مقدار کافی مایعات مصرف کرده و هر سه ساعت یکبار ادرار کنید و در صورت بروز تب یا سوزش و درد در هنگام ادرار کردن به پزشک مراجعه کنید.
- 6- جهت جلوگیری از بروز درد در هنگام جابجا شدن در تخت و موقع راه رفتن حمایت محل عمل روی شکم بوسیله قراردادن کف دست روی ناحیه عمل شده یا استفاده از شکم بند میتواند موثر باشد.
- 7- جهت بهبود گردش خون و جلوگیری از ایجاد عوارض باید هر چه سریعتر از بستر خارج شده و یا حمایت راه بروید.
- 8- مصرف دخانیات و الکل باید قطع گردد.
- 9- جهت ترمیم سریعتر محل زخم باید از رژیم غذایی پرپروتئین پرکالری و سرشار از ویتامین استفاده کنید مصرف سبزیجات و مرکبات و آب میوه های تازه حاوی ویتامین C می تواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند از مصرف غذاهای نفاخ بپرهیزید.
- 10- در صورت هر گونه مشکل پس از ترخیص می توانید به درمانگاه اورژانس مراجعه کنید.
- 11- در حفظ کارت ترخیص خود کوشا باشید و در زمان توصیه شده جهت کنترل به پزشک معالج خود مراجعه کنید در زمان ترخیص برگ خلاصه پرونده و شرح عمل به شما تحویل داده می شود که زمان مراجعه بعدی به درمانگاه همراه داشتن این برگه ها در ویزیت های بعدی الزامی است.

مجتمع آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

تهیه کننده: لاله افروز کارشناس آموزش به بیمار



