

## آمپول وراپامیل AMP 2.5 mg/mL (2 mL)

**دسته دارویی:** مسدود کننده کانال کلسیمی (CCB)

**گروه دارویی:** آنتی آریتمی، درمان کمکی در هیپرتانسیون، درمان کمکی در آنژین صدری

**موارد مصرف:**

هیپرتانسیون، آنژین صدری، تکیکاردی های فوق بطنی (Af-PSVT-PAC)

**عوارض:** نارسایی احتقانی قلب، برادیکاردی، آسیستول، کاهش فشار خون

**آنتی دوت وراپامیل:** کلسیم گلوکونات می باشد.

**دوز مصرف:**

۲-۲/۵ میلی گرم در عرض یک تا دو دقیقه و در صورت عدم پاسخ ۱۰-۵ میلی گرم در طول پنج دقیقه، و حداکثر دوز مجاز ۳۰ میلی گرم

**توجهات پرستاری:**

۱- تزریق وراپامیل بدون رقیق کردن و بصورت **IV SLOW** تزریق می گردد.

۲- در انسداد درجه دو و سه گره دهلیزی-بطنی، سندرم w.p.w همراه با فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزی منع مصرف دارد.

۳- مانیتورینگ فشارخون و ضربان قلب ضروری می باشد. آنتی دوت آن و وسایل احیا در زمان تزریق باید در دسترس باشند.

۴- دارو باید شفاف باشد. در صورت کدر بودن نباید تزریق گردد.

۵- استفاده از وراپامیل با داروهای بلوک کننده بتا و بلوک کننده های کانال کلسیم به طور همزمان ممنوع می باشد.

